

Antiseptikum zur Linderung der Symptomatik bei bakteriellen oder pilzbedingten* Infektionen

octenisept® Vaginaltherapeutikum

Unser Plus

- Wirkt bei bakteriellen und pilzbedingten Infektionen*
- Hilft auch bei wiederkehrenden Infektionen
- Inklusive Vaginalapplikator für eine einfache Anwendung
- Eignet sich auch zur Behandlung des Partners und bei Schwangeren**
- octenisept® Vaginaltherapeutikum ist farblos - keine unangenehmen Flecken in der Wäsche

Anwendungsgebiet

Zur Linderung der Symptomatik bei bakteriell oder durch Pilzinfektionen (Candidosen) bedingtem Juckreiz, Brennen und Ausfluss im Vaginalbereich

Anwendungshinweise

Wenden Sie octenisept Vaginaltherapeutikum am ersten Tag der Behandlung morgens und abends an, danach jeweils einmal täglich. Die Behandlungsdauer beträgt sieben Tage.

Vor der ersten Anwendung nehmen Sie zuerst die Schutz- und Sprühkappe ab und verwahren diese sicher. Entnehmen Sie anschließend den Vaginalapplikator aus der Hülle und setzen diesen auf die Flasche.

Betätigen Sie die Sprühpumpe achtmal vor der ersten Anwendung, um eine korrekte Dosierung zu gewährleisten. Vor jeder folgenden Anwendung ist lediglich der Applikator wieder aufzusetzen und der Sprühkopf zu betätigen, bis etwas Präparat austritt.

Führen Sie den Vaginalapplikator für die Anwendung auf der Toilette sitzend tief in die Vagina ein und betätigen die Sprühpumpe zehnmal hintereinander. Sprühen Sie nach der Anwendung mit nach unten gerichtetem Applikator etwas Präparat, z. B. über dem Waschbecken, aus. Spülen Sie den Applikator anschließend unter fließendem Wasser und trocknen ihn mit einem sauberen Tuch ab.

Um einer möglichen Wiederansteckung vorzubeugen wird eine Mitbehandlung des Partners empfohlen. Bei einem männlichen Partner sprühen Sie das Präparat ohne Vaginalapplikator, jedoch mit aufgesetzter Sprühkappe, auf das männliche Genital bis zur vollständigen Benetzung auf.

Bei unveränderten Symptomen und wiederkehrenden Vaginalinfektionen sollten Sie einen Gynäkologen aufsuchen.

In der Leitlinie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V. (AWMF) der Deutschen, Österreichischen und Schweizer Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (S2k) wird Octenidin und das octenisept Vaginaltherapeutikum als antiseptische Therapieoption zur Behandlung der Bakteriellen Vaginose empfohlen. (015-028, Stand Juni 2023)

Laut AWMF Leitlinie der Deutschen, Österreichischen und Schweizer Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (S2k) wird Octenidin als antiseptische Therapieoption bei

octenisept® Vaginaltherapeutikum

Vulvovaginalkandidose empfohlen.

(015-072, Stand September 2020)

Produktdaten

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Octenidindihydrochlorid 0,1 g, Phenoxyethanol (Ph.Eur.) 2,0 g. **Sonstige Bestandteile:** 2-[(3-Kokosfettsäureamidopropyl)dimethylazaniumyl]acetat, Natrium-D-gluconat, Glycerol 85 %, Natriumchlorid, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser.

Besondere Hinweise

- octenisept® Vaginaltherapeutikum nicht in größeren Mengen verschlucken oder in den Blutkreislauf, z.B. durch versehentliche Injektion, gelangen lassen.
- octenisept® Vaginaltherapeutikum nicht mit Antiseptika auf PVP-Iod-Basis auf benachbarten Hautarealen verwenden, da es zu starken braunen bis violetten Verfärbungen kommen kann.
- Bei Anwendung von octenisept® Vaginaltherapeutikum kann als subjektiv empfundenes Symptom in seltenen Fällen ein vorübergehendes Brennen auftreten.
- Nach Anbruch: Im Behältnis verbliebene Restlösung ist nach Abschluss der Behandlung zu verwerfen.
- octenisept® Vaginaltherapeutikum für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Grundsätzlich gilt: Die Anwendung aller Arzneimittel innerhalb des ersten Trimesters der Schwangerschaft soll unter strenger Indikation und ärztlicher Aufsicht erfolgen.
- Die Anwendung von octenisept® Vaginaltherapeutikum im Auge ist zu vermeiden. Bei versehentlichem Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen.
- Nicht einfrieren.

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	GTIN	PZN	Art.-Nr.
octenisept Vag.therap. 50 ml FL	20 / Karton(e)	4032651214419	615641	121441

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Informationen

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com.

Für individuelle Fragen:

Application Department

Telefon: +49 40 52100-666

E-Mail: info@schuelke.com

Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG
octenisept® Vaginaltherapeutikum Anwendungsgebiete: Antiseptikum zur Behandlung von Vaginalinfektionen. Linderung der Symptomatik bei bakteriell oder durch Pilzinfektion (Candidosen) bedingtem Juckreiz, Brennen und Ausfluss im Vaginalbereich. Warnhinweise: octenisept® Vaginaltherapeutikum nicht in größeren Mengen verschlucken oder in den Blutkreislauf gelangen lassen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

* Candidosen
** Ab dem 4. Monat

schülke

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Straße 2
22851 Norderstedt | Deutschland
Tel. +49 40 52100582
www.schuelke.com
info@schuelke.com

schülke Osterreich
Schülke& Mayr GmbH (Austria)
Seidengasse 9
1071 Wien | Österreich
Tel. 43-1-5232501-0
www.schulke.com
office.austria@schuelke.com

schülke Schweiz
Schülke & Mayr AG
Hungerbüelstrasse 22 22
8500 Frauenfeld | Schweiz
Tel. +41 44 466 55 44
www.schuelke.com
mail.ch@schuelke.com

Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

999 / 910027-DE-de-DE-06.14 2025
Produktinformation wird nicht vom Änderungsdienst erfasst.